

حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت

تمارين حول الدرس

التمرين 1


المعادلة الزمنية لحركة نقطة M من جسم صلب في دوران حول محور ثابت هي : $s(t) = 0,70t + 0,03$ حيث t بالثانية و s(t) بالمتر (m).

1 - ما طبيعة حركة الجسم الصلب ؟

2 - حدد قيمة الأقصول المنحني للنقطة M عند اللحظة $t=0$.

3 - إذا علمت أن قطر المسار الدائري للنقطة M هو 30cm ، أوجد تعبير الأقصول الزاوي $\theta(t)$ للنقطة M بدلالة الزمن t.

التمرين 2



تمثل الوثيقة أعلاه تسجيلاً بالسلم الحقيقي، لحركة نقطة M من جسم صلب في دوران حول محور ثابت .

1 - حدد سرعات M عند اللحظات الموقعة للمواضع التالية M_1 و M_3 ، ثم مثل متجهتي السرعتين في هاتين النقطتين .

2 - استنتج طبيعة حركة النقطة M ؟

3 - حدد مبيانيا الشعاع R لمسار حركة M والسرعة الزاوية ω لهذه النقطة .

4 - أكتب المعادلة الزمنية $\theta(t)$ باعتبار M_0 أصلًا للأقصول المنحني وتاريخ لحظة تسجيل M_2 أصلًا للتاريخ .

التمرين 3

ساق متGANسة AB طولها $\ell = 1\text{m}$ تدور حول محور 'ZZ' عمودي على AB ويمر من النقطة O بحيث أن $OA = 3OB$.

1 - أوجد السرعة الزاوية لدوران الساق حول المحور 'ZZ' علماً أن السرعة الخطية ل A هي $v_A = 1\text{m/s}$.

2 - ما هي سرعة النقطة B ؟

3 - ما هي سرعة النقطة O ؟

التمرين 4

رسم نقطة M من متحرك في دوران حول محور ثابت مساراً دائرياً شعاعه $R = 2\text{m}$. سرعتها الزاوية ثابتة $\omega = 2\text{rad/s}$.

عند اللحظة $t = 1\text{s}$ تحمل الموضع A ذي الأقصول الزاوي $\theta = \pi/6$.

1 - أوجد المعادلة الزمنية $\theta(t)$ لحركة النقطة M

2 - ما هي سرعتها الخطية ؟

3 - ما هي المدة الزمنية لكي ينجز المتحرك دورة كاملة ؟

تمرين 5

يدور قمران اصطناعيان S_1 و S_2 في نفس المنحى حول الأرض ، على مدارات دائرتين C_1 و C_2 ينتميان لنفس المستوى ولهم نفس المركز O الذي ينطبق مع مركزها .

نعتبر أن القمران جسمان نقطيان ويدوران بسرعات زاوية ثابتة $\omega_1 = 9.10^{-4}\text{rad/s}$ و $\omega_2 = 8.10^{-4}\text{rad/s}$.

نختار أصل التواريخ اللحظة التي يكون فيها القمران محمولين من طرف الشعاع للأرض .

1 - خلال أي مدة زمنية يكون القمران من جديد جنباً إلى جنب ؟

2 - استنتاج أن الظاهرة دورية وحدد دور الإلتقاءات .


التمرين 6 (السرعة الخطية والسرعة الزاوية للكواكب)

نقبل أن الكواكب عطارد والمريخ كنقطتين مadiتين وحركتهما في الجسم المرجعي النجمي (نعتبر أصله مركز الشمس ومحاوره موجهة نحو ثلاثة نجوم بعيدة جداً وثابتة . ويسمى كذلك بالجسم المرجعي لكوبونيـك) حركة دائرية ومنتظمة .

حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت

نعطي : المسافة بين عطارد والشمس $D_2 = 778 \times 10^6 \text{ km}$ ، المسافة بين المريخ والشمس $D_1 = 58 \times 10^6 \text{ km}$ ، المدة الزمنية لدوران كاملة لعطارد حول الشمس $T_1 = 88 \text{ J}$ و المدة الزمنية لدوران كاملة للمريخ حول الشمس $T_2 = 4332 \text{ J}$

- 1 - أحسب السرعة الخطية لكل من الكوكبين في الجسم المرجعي النجمي .
- 2 - أحسب السرعة الزاوية للكوكبين في نفس المرجع .
- 3 - خلال سنة ، أحسب α_1 و α_2 زاويتي الدوران للكوكبين .



التمرين 7 (سرعة نقطة من سطح الأرض)

نعتبر أن الأرض كروية الشكل شعاعها $R = 6380 \text{ km}$. تدور الأرض حول نفسها خلال المدة T والتي توافق يوماً فلكياً .

- 1 - أعط السرعة الزاوية لدوران الأرض .
- 2 - أوجد تعبير السرعة الخطية V لنقطة M من سطح الأرض معلومة بخط عرض λ في المعلم المركزي الأرضي بدلاً λ و R .

3 - أحسب السرعات V_1 و V_2 و V_3 على التوالي للنقطة التي توجد في خط الإستواء ($\lambda = 0^\circ$) . في أسفين ($\lambda = 32^\circ$) في لندن ($\lambda = 51^\circ$) .

نعطي مدة يوم فلكي : $T = 23\text{h}56\text{ min} 4\text{s}$

التمرين 8

قرصان D_1 و D_2 ملتحمان وأفقيان شعاعهما على التوالي $R_2 = 30\text{cm}$ و $R_1 = 20\text{cm}$ في حركة دوران منتظم حول نفس المحور (Δ) الذي يمر من مركز قصورهما O .

ω_1 السرعة الزاوية للقرص D_1 و ω_2 السرعة الزاوية للقرص D_2

لتكن A_1 و A_2 نقطتين تنتهيان على التوالي لمحيط القرصين D_1 و D_2 .

عند اللحظة $t = 0$ توجد النقطة O و A_1 و A_2 على نفس الاستقامة .

- 1 - في تجربة أولى ، نلاحظ أنه خلال المدة الزمنية A_1 قوس طوله يوافق ربع دورة بينما النقطة A_2 قطعت قوس طوله يواافق ثلث دورة . أحسب ω_1 و ω_2 .
- 2 - أحسب المسافة المقطوعة من طرف A_1 و A_2 خلال دقيقة .
- 3 - أحسب السرعة الخطية لكل من النقطتين A_1 و A_2 .